CIPERT 10

Composición: Cipermetrina 10% p/v [EC]
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Uso: Insecticida
Presentación: 1L. y 5L.
N° Registro: 19292

Características del Producto

CIPERT 10 es un insecticida piretroide altamente eficaz para controlar una amplia gama de insectos chupadores y masticadores, incluso aquellos resistentes a otros grupos de insecticidas.

Composición química



Consejos de uso y Precauciones

Aplicar en pulverización normal con tractor y al aire libre. En tratamientos repetidos puede incluir la proliferación de ácaros, por los que se recomienda vigilar los cultivos en los que son frecuentes los ataques de los mismos, para aplicar, si fuera necesario, acaricidas específicos. Es compatible con la mayoría de los productos excepto con los alcalinos y compuestos de azufre.

Consultar con el servicio técnico de FAESAL en caso de duda sobre mezclas. Almacenar evitando la humedad, y a temperaturas que no estén debajo de -15°C o más de +40°C. Antes de utilizar el producto, leer detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Modo de Acción

CIPERMETRINA es un piretroide sintético con actividad insecticida, no sistémico, de amplio espectro, eficaz tanto por contacto como por ingestión. Tiene marcada actividad repelente. Se caracteriza por su gran actividad insecticida a muy bajas dosis, por su rápida acción: efecto de choque, buena persistencia y alta eficacia contra Lepidópteros. Es muy resistente al lavado por lluvia. La mayoría de las plagas resistentes a los organofosforados y organoclorados son sensibles. Sin actividad sobre ácaros, excepto garrapatas, por lo que es necesario complementarlo con un acaricida específico.

Su degradación en el suelo es muy rápida. Las vidas medias respectivas son de 4 y 2 semanas para los isómeros cis y trans, en tierra arcillosa o en tierra vegetal arenosa. Se considera ligeramente persistente (1-4 semanas). La hidrólisis de la función éster es la principal vía de degradación; una vía menor la constituye la hidroxilación del grupo fenoxi, seguida de la hidrólisis de la función éster. El producto final de la degradación es CO2. La hidrólisis es más lenta en medio anaerobio que en medio aerobio y se observa acumulación de ácido 3-fenoxibenzoico.

FORMULADORES AGROQUÍMICOS EXTREMEÑOS, S.L.
Ctra. Badajoz-Granada, km. 26
06170 La Albuera (Badajoz)
Tel: 924 480 151 Fax: 924 480 103
www.faesal.com

CIPERT 10

Usos Autorizados

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (l/ha)	FORMA Y ÉPOCA APLICACIÓN
Alcachofa. algodonero, calabaza, melón y sandía.	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE. LEPIDÓPTEROS.	0.25 – 0.5	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha.
Alfalfa	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE CUCA DE LA ALFALFA, COLASPIDEMA ATRUM. GUSANO VERDE DE LA ALFALFA, HYPERA POSTICA. LEPIDÓPTEROS.	0.25 – 0.5	Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, en un volumen de caldo entre 150-1000 l/ha
Apionabo, colinabo, chirivía, escorzonera, nabo, rábano y zanahoria.	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE COLEÓPTEROS LEPIDÓPTEROS MOSCAS BLANCAS, ALEYRODIDAE. TRIPS	0.25 – 0.5	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha
Avena, cebada, centeno, trigo (incluye espelta) y triticale	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE	0.25	Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha.
Berenjena y tomate	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE LEPIDÓPTEROS MOSCAS BLANCAS, ALEYRODIDAE.	0.25 – 0.5	Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha.
Brécol, coliflor y repollo	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE LEPIDÓPTEROS PULGUILLA DE LA COL, PHYLLOTRETA SPP. BRÉCOL PULGUILLA DE LA COL, PSYLLOIDES CHRYSOCEPHALA	0.25 – 0.5	Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha.
Colza, mostaza y mostaza blanca	CURCULIÓNIDOS, CURCULIONIDAE MELIGETHES, BRASSICOGETHES AENEUS	0.25	Efectuar 2 aplicaciones como máximo con un intervalo de 14 días entre ellas, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha.
Haba verde, guisante verde y judía verde	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE. LEPIDÓPTEROS	0.25 – 0.5	Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha.
Maíz	DIABRÓTICA DEL MAÍZ, DIABROTICA VIRGIFERA. LEPIDÓPTEROS PIRAL DEL MAÍZ, O.NUBILALIS. TALADROS DEL MAÍZ, SESAMIA SPP.	0,75	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días, en un volumen de caldo de 150-1.000 l/ha.

CIPERT 10

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (l/ha)	FORMA Y ÉPOCA APLICACIÓN
Olivo	PRAYS, POLILLA DEL OLIVO, PRAYS OLEAE	0.3	Efectuar 1 aplicación por campaña, no más tarde del fin de la floración, en un volumen de caldo de 1000 l/ha.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera*, ornamentales herbáceas.	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE. MOSCAS BLANCAS, ALEYRODIDAE.	0.25 – 0.5	Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha.
Patata	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE. ESCARABAJO DE LA PATATA, LEPTINOTARSA DECEMLINEATA	0.4 – 0.5	Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha.
Remolacha azucarera, de mesa y forrajera	ÁFIDOS, PULGONES, APHIDIDAE. CÁSIDA DE LA REMOLACHA, CASSIDA VITTATA. LEPIDÓPTEROS NOCTUIDOS, NOCTUIDAE	0.25 – 0.5	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha.
Vid	MOSQUITOS VERDES, EMPOASCA SPP. PIRAL DE LA VID, SPARGANOTHIS PILLERIANA. POLILLA DEL RACIMO, LOBESIA BOTRANA.	0.25 – 0.3	Efectuar 1 única aplicación, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 200-1500 l/ha.

* Palmera datilera: Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano)

Plazos de Seguridad

USO	P.S.(días)
Remolacha azucarera	14
Algodonero, Colza, Mostaza, Mostaza blanca y Vid	21
Avena, Cebada, Centeno, Espelta, Trigo, Triticale	28
Alcachofa, Apionabo, Berenjena, Brécol, Calabaza, Chirivia, Coliflor, Colinabo, Escorzonera, Guisantes verdes, Judías verdes, Melón, Nabo, Patata, Rábano, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera, Repollo, Sandía, Tomate, Zanahoria	3
Alfalfa	7
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, Frondosas, Maíz, Olivo, Ornamentales herbáceas y Palmáceas	NP

P.S.: Plazo de seguridad en días