

BOROFAEMIN 84 Plus



Uso: Correctores de Carencias

Presentación: Envases de 1, 5 y 20 L

Características del Producto

Nutriente líquido especial, mezcla de boro y aminoácidos, formulado para facilitar la asimilación del boro por la planta, así como la distribución de este hacia los puntos de consumo gracias a los aminoácidos.

Composición y Formulación

Contenido declarado	(p/p)
Boro (B) soluble en agua	8%
Aminoácidos libres	4%
Nitrógeno (N) total	1.4%
Nitrógeno (N) orgánico	1.08%
Nitrógeno (N) amoniacal	0.28%
Molibdeno (Mo) sol. en agua, en forma mineral	0.16%

Aminograma: ácido aspártico, ácido glutámico, serina, histidina, glicina, treonina, alanina, arginina, tirosina, valina, metionina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina y prolina (hidrólisis química de proteína vegetal)

Densidad: 1.28 g/cc pH= 7 – 8

Modo de Acción

Provoca la reactivación y recuperación del cultivo de situaciones de estrés. Su aplicación favorece una correcta floración, fecundación y cuajado de frutos en zonas y cultivos con tendencia a manifestar carencias. Equilibra el estado nutricional de la planta y previene estados carenciales a lo largo del ciclo de cultivo.

Consejos de Uso y Recomendaciones

Aplicar durante los 2 – 3 primeros riegos a prebrotación en leñosas para asegurar un correcto inicio de cultivo.

Aplicar a prefloración para cubrir las necesidades puntuales en la formación de órganos asexuales.

En aplicación foliar es aconsejable mezclar con mojante no iónico.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Estabilidad 24h a 5°C y hasta 2 días a 40°C en su envase original. Evitar temperaturas por debajo de 5°C y por encima de 40°C.

Incompatibilidades: No mezclar con aceites minerales, azufre, ni compuestos de reacción alcalina. No mezclar con calcio ni con ácidos ni bases fuertes. No aplicar en ciruelos. No mezclar con compuestos cúpricos excepto en olivo.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



BOROFAEMIN 84 Plus



Dosis y modo de empleo

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS
Forrajeras	FOLIAR	1.5 – 2 L/ha. Después de cada corte
Girasol	FOLIAR	200 – 400 cc/hl. Inicio del ciclo y aparición del botón floral.
Frutales	RADICULAR	3 – 5 L/ha. Prebrotación y caída de hoja.
	FOLIAR	300 – 400 cc/hl. Prefloración y cuajado.
Olivo	RADICULAR	3 – 5 L/ha. Inicio de ciclo en primavera, a los 15 días y en post-recolección.
	FOLIAR	300 – 500 cc/hl. Inicio de ciclo en primavera, a los 15 días en post-recolección
Hortícola	RADICULAR	2 – 3 L/ha. En prefloración con masa foliar para recibir el tratamiento.
	FOLIAR	150 – 300 cc/hl. En prefloración con masa foliar para recibir el tratamiento.