OLIfae engorde

Uso: Bioactivador - Calidad del fruto
Presentación: Envases de 1, 5 y 20 L.

Características del Producto

Solución de NPK especial para el engorde y acumulación de azúcares en el fruto. Es un nutriente líquido de rápida asimilación para aplicación vía foliar o vía radicular mediante el riego.

Composición y Formulación

Contenido declarado	**(p/p)**
Aminoácidos libres	0.5%
Nitrógeno (N) total	3%
Nitrógeno (N) amoniacal	0.17%
Nitrógeno (N) nítrico	1.25%
Nitrógeno (N) ureico	1.47%
Nitrógeno (N) orgánico	0.14%
Fósforo (P_2O_5) sol. en agua	8%
Potasio (K_2O) sol. en agua	13%
Boro (B) soluble en agua	0.1%

Aminograma: ácido aspártico, ácido glutámico, serina, histidina, glicina, treonina, alanina, arginina, tirosina, valina, metionina, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina y prolina (hidrólisis química de proteína vegetal.

Densidad: 1.23 g/cc pH: 7 – 8

Modo de Acción

OLIfae engorde contiene aminoácidos libres esenciales que ponen a disposición de la planta los elementos que necesita en mayor cantidad en las etapas de engorde y fructificación.

Favorece la respiración celular y facilita la producción de numerosas enzimas que catalizan reacciones que intervienen en el llenado y engorde del fruto.

Resultados evidentes desde la primera aplicación tras el cuajado, y repitiendo esta cada 12-15 días hasta la cosecha.

Tiene una alta solubilidad en agua y un pH cercano a la neutralidad y muy buenas características para la aplicación foliar.

Gracias a los aminoácidos libres tiene una mayor capacidad de penetración al flujo sistémico de la planta, por este motivo es utilizado como ingrediente en los caldos de aplicación de tratamientos fitosanitarios.

Consejos de Uso y Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Estabilidad 24h a 5ºC y hasta 2 días a 40ºC en su envase original. Evitar temperaturas por debajo de 5ºC y por encima de 40ºC.

Incompatibilidades: No mezclar nunca con productos ácidos o muy alcalinos. No mezclar con productos que contengan calcio o magnesio. No mezclar con aceites minerales. Compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común. Realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

FORMULADORES AGROQUÍMICOS EXTREMEÑOS, S.L.
Ctra. Badajoz-Granada, km. 26
06170 La Albuera (Badajoz)
Tel: 924 480 151 Fax: 924 480 103
www.faesal.com

OLIfae engorde

Dosis y modo de empleo

CULTIVO	VÍA	DOSIS	RECOMENDACIÓN
Olivo	FOLIAR	50-100 cc/mochila	Durante la etapa de endurecimiento del hueso y el engorde de la aceituna.
		350-650 cc/100 litros	
	RADICULAR	5 cc/litro de agua	
Viña	FOLIAR	30-60 cc/mochila	Desde cuajado hasta envero o cambio de color de la baya
		200-40 cc/100 litros	
	RADICULAR	3 cc/litro de agua	
Hortícolas	FOLIAR	40-80 cc/mochila	Desde cuajado del fruto hasta 15 días antes de la recolección.
		300-500 cc/100 litros	
	RADICULAR	4 cc/litro de agua	