

TORCAZ

Composición: Acetamiprid 20% p/p

Formulación: Gránulos solubles en agua (SG)

Uso: Insecticida

Presentación: 600 gramos


Nº Registro: ES-00876



Características del Producto

TORCAZ es un insecticida sistémico a base de acetamiprid con acción translaminar y actividad por contacto e ingestión para su uso en colza, frutales de pepita y hueso. Acetamiprid es un insecticida neonicotinoide que actúa sobre el sistema nervioso del insecto causando parálisis.

Composición química



Consejos de uso y Precauciones

Para aplicadores profesionales.

Aplicar en pulverización foliar mecánica o manual. Cuando se aplica con tractor se realizará en cabina cerrada. Aplicar a las dosis indicadas en la tabla cuando aparezcan signos de infestación.

Preparación de la mezcla, aplicación y limpieza

No preparar una cantidad de caldo superior a la requerida para el tratamiento.

Para la preparación del caldo, llenar la mitad del tanque con agua limpia y poner en marcha la agitación. Añadir la cantidad de producto necesaria para la superficie a tratar y completar con agua. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.

Limpiar el equipo de aplicación inmediatamente después del uso.

OBSERVACIONES:

El preparado no se usará en combinación con otros productos. Se recomienda adoptar una estrategia para la prevención y manejo de la resistencia. Además, se deben realizar evaluaciones periódicas para monitorear a lo largo del tiempo cualquier posible evolución de la susceptibilidad de las plagas al producto.

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Modo de Acción

Cloronicotinilo, neonicotinoide sistémico con actividad insecticida y acción translaminar, eficaz contra isópteros, homópteros, tisanópteros, lepidópteros, incluso polillas de los frutales, y coleópteros. Posee actividad larvicida y ovicida. Los insectos tratados muestran inmediatamente síntomas de envenenamiento con excitación y parálisis. Actúa como antagonista sobre el receptor acetilcolina nicotínico del sistema central, primero estimulando las membranas postsinápticas y después paralizando la conducción nerviosa.

Se degrada rápidamente en suelos aerobios con una vida media de 1 a 8.2 días. Su fotodegradación no es importante en los suelos. Se consideran de moderada a altamente móviles en el suelo. No se bioacumula ni en peces ni en sedimentos.

Apto para aplicación foliar y al suelo. Es altamente eficaz contra especies resistentes a insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides. Para evitar la aparición de razas resistentes se recomienda utilizar alternándolo con otros insecticidas de acción diferente.



FORMULADORES AGROQUÍMICOS EXTREMEÑOS, S.L.

Ctra. Badajoz-Granada, km. 26

06170 La Albuera (Badajoz)

Tel: 924 480 151 Fax: 924 480 103

www.faesal.com

Usos Autorizados

CULTIVO	AGENTE	DOSIS kg/ha	N° Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo (l/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Colza	Meligethes, Brassicogethes aeneus	0,2	1	NA	400 - 600	Aplicar en presencia de la plaga, antes del BBCH-69
Manzano	Áfidos, Pulgones, Aphididae	0,25	2	14 días	1000	Excepto contra las especies E. lanigerum y A. spiraecola. Aplicar en presencia de la plaga antes del BBCH 59 y desde el BBCH 69. No aplicar durante la floración
Melocotonero	Áfidos, Pulgones, Aphididae	0,25	1	NA	1000	Aplicar en presencia de la plaga antes del estadio BBCH 59 y desde el BBCH 69. No aplicar durante la floración.
Peral	Áfidos, Pulgones, Aphididae	0,25	2	14 días	1000	Excepto contra las especies E. lanigerum y A. spiraecola. Aplicar en presencia de la plaga antes del BBCH 59 y desde el BBCH 69. No aplicar durante la floración

Plazos de Seguridad

USO	P.S.(días)
Manzano, Melocotonero, Peral	14
Colza	42

P.S.: Plazo de seguridad en días